

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ ГАМ-КОВИД-ВАК (торговая марка «Спутник V»)

Уважаемые пациенты!

Просим Вас внимательно ознакомиться с памяткой о правилах проведения вакцинации в Группе клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»:

- 1** Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
- 2** Противопоказаниями для проведения вакцинации являются:
 - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты
 - тяжелые аллергические реакции в анамнезе
 - острые инфекционные и неинфекционные заболевания
 - обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии)
 - беременность и период грудного вскармливания
 - возраст до 18 лет
- 3** Вакцинация проводится в два этапа: вначале вводится компонент I, через 21 день — компонент II. Оба компонента вводятся внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча в дозе 0,5 мл.
- 4** Перед проведением вакцинации пациент заполняет анкету, врач-терапевт проводит осмотр с измерением температуры, сбором анамнеза, измерением насыщения крови кислородом и осмотром зева, на основании которых врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний к вакцинации. После получения информации о возможных реакциях на вакцинацию пациент подписывает информированное добровольное согласие на процедуру.
- 5** В течение 30 минут после вакцинации необходимо оставаться в клинике для того, чтобы своевременно получить помощь при появлении возможных аллергических реакций.
- 6** В течение 1–2 дней после введения компонента вакцины (как первого, так и второго) возможно возникновение кратковременных симптомов:
 - гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием и головной болью
 - болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность
 - аллергические реакции
 - реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфоузловЭти симптомы проходят в течение трех последующих дней.
- 7** Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну и баню, не принимать алкоголь, а также избегать чрезмерных физических нагрузок.
- 8** При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации следует принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.

Берегите себя и будьте здоровы!